

Положительная	(+++)	Волдырь (папула) 6-10 мм, гиперемия или волдырь 6-10 мм с псевдоподиями, гиперемия – скарификация; Волдырь (папула) 11-15 мм, гиперемия – прик-тест
Положительная	(++++)	Волдырь (папула) более 10 мм, гиперемия или волдырь (папула) более 10 мм с псевдоподиями, гиперемия – скарификация; Волдырь (папула) более 15 мм с псевдоподиями, гиперемия – прик-тест

Внутрикожные пробы

Результаты учитывают через 20 мин и 24 ч, измеряя размеры инфильтрата (папулы) и гиперемии в мм. Результаты регистрируют согласно прилагаемым табл. 2 и 3.

Таблица 2-Схема учета внутрикожных реакций через 20 мин

Оценка реакции		Размер и характер реакции	
		Инфильтрат	Гиперемия
Отрицательная	(–)	Папула не более 1-3 мм	Отсутствует
Положительная	(+)	Папула 4-8 мм	Гиперемия
Положительная	(++)	Папула 9-15 мм	Гиперемия
Положительная	(+++)	Папула более 15 мм или папула более 15 мм с псевдоподиями	Гиперемия

Таблица 3 - Схема учета внутрикожных реакций через 24 ч

Оценка реакции		Размер и характер реакции	
		Инфильтрат	Гиперемия
Отрицательная	(–)	Папула не более 1-3 мм	Отсутствует
Положительная	(+)	Папула 8-19 мм	В пределах инфильтрата и