

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

Разведения и тритурации получают из гомеопатической фармацевтической субстанции при помощи процесса потенцирования в соответствии с гомеопатической производственной практикой.

Различают способы потенцирования по Ганеману, Корсакову и LM-метод (ОФС «Растворы и жидкие разведения гомеопатические»).

Обычно используют следующие степени потенцирования:

- 1 часть активного компонента плюс 9 частей растворителя; обозначают как «D» (десятичное разведение);
- 1 часть активного компонента плюс 99 частей растворителя; обозначают как «C» (сотенное разведение).

Число степеней потенций определяет меру разведения, например, «D3», обозначает третью десятичную потенцию, а «C3», третью сотенную потенцию.

«LM-» (или «Q-») потенцию готовят в соответствии со специфическими процедурами (пятидесятитысячное разведение 1/50 000 с самой высокой степенью потенцирования LM30).

Различают следующие степени разведения (потенции):

- D со степенью разведения 1:10 на шаг потенцирования (десятичное разведение);
- C со степенью разведения 1:100 на шаг потенцирования (сотенное разведение);
- M со степенью разведения 1:1000 на шаг потенцирования (тысячное разведение);
- LM со степенью разведения 1:50000 на шаг потенцирования (пятидесятитысячное разведение);

Обычно используют следующие разведения:

- D2, D3, D6 (C3), D12, (C6);
- C12, C13, C30, C50, C100, C200, C500, C1000, C10000;