

наслаивают на $(100 - X - Y)$ г ядер гранул, где X – количество сахара в сахарном сиропе, в граммах; Y – количество вспомогательного вещества, содержащееся в тритурации, в граммах.

В. Наслаивание смесей.

Смеси готовят в соответствии с ОФС «Смеси гомеопатические» путем совместного встряхивания водных гомеопатических разведений и (или) тритураций в сахарном сиропе.

Для получения 100 г гранул гомеопатических 1 г смеси встряхивают с 9 г сахарного сиропа и 10 г этого разведения равномерно наслаивают на $(100 - X - Y)$ г ядер гранул, где X – количество сахара в сахарном сиропе, в граммах; Y – количество вспомогательного вещества, содержащееся в тритурациях, в граммах.

Наслаивание гомеопатических разведений активных компонентов в сахарном сиропе на ядра гранул производят в дражировочных котлах с регулируемым подогревом. Ядра гранул помещают в дражировочный котел, предварительно подогретый до $37 - 42$ °С, и медленно вращают до тех пор, пока вся масса гранул не нагреется до той же температуры. Гомеопатические разведения активных компонентов в сахарном сиропе вливают в дражировочный котел постепенно, небольшими равными порциями, через равные промежутки времени. По окончании наслаивания нагрев дражировочного котла прекращают, а вращение его продолжают для высушивания гранул до постоянной массы (в соответствии с технологическим регламентом).

Способ 3. Гранулы гомеопатические получают путем распыления насыщенного раствора лактозы на кристаллы лактозы до формирования гранул шаровидной формы требуемого диаметра в постоянном токе теплого воздуха, с последующим распылением 20 % раствора лактозы с добавлением гомеопатических разведений, приготовленных по десятичной (1:10),