

Размер частиц измельченного лекарственного растительного сырья или сырья животного происхождения и способ получения настойки указывают в фармакопейной статье или нормативной документации. Если не указано иначе, свежее лекарственное растительное сырье измельчают до образования кашицы, а высушенное – до частиц, размер которых указан в табл. 1 (для настоек гомеопатических матричных, получаемых способами 1-4).

Таблица 1 – Размер частиц высушенного сырья растительного происхождения в зависимости от его морфологической группы или содержащейся в нем группы БАВ

Вид используемого высушенного лекарственного растительного сырья	Размер частиц, мм
Листья, травы, цветки	4
Коры, побеги, подземные органы (корни, корневища, клубни, клубнелуковицы, луковицы и др.)	3
Плоды и семена	2
Растительное сырье, содержащее алкалоиды	1

Высушенное лекарственное растительное сырье, предназначенное для получения настоек гомеопатических матричных ферментированных, если не указано иначе в фармакопейной статье или нормативной документации, должно быть измельчено до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером не более 0,5 мм (ОФС «Ситовой анализ»).

Лекарственное растительное сырье должно соответствовать требованиям ОФС «Лекарственное растительное сырье для гомеопатических лекарственных препаратов».

В качестве сырья для получения настоек гомеопатических матричных на глицерине используют животных, их части или их выделения. При этом переработка частей высших животных (теплокровных) осуществляется непосредственно после убоя, низших животных умерщвляют непосредственно перед переработкой в токе углерода диоксида. Сырье животного происхождения должно соответствовать требованиям ОФС «Сырье животного происхождения для гомеопатических лекарственных препаратов».