

прохладное, защищенное от света место и настаивают не менее 6 месяцев; образующийся при настаивании осадок не используют.

Способы 7.1-7.5. Настойки гомеопатические матричные ферментированные получают из свежего растительного сырья.

Смешивают 100 частей измельченного свежего лекарственного растительного сырья с определенными количествами воды и молочной сыворотки. Необходимые для получения настойки гомеопатической матричной ферментированной количества молочной сыворотки и воды указаны в таблице 4. Измеряют величину pH смеси и далее поступают, как указано в способах 5.1-5.5.

Таблица 4 – Количества (в частях) молочной сыворотки и воды, необходимые для получения настоек гомеопатических матричных ферментированных способами 7.1-7.5

№ способа	Молочная сыворотка	Вода
7.1	50	Не прибавляют
7.2	50	25
7.3	50	75
7.4	15	110
7.5	50	225

Способ 8. Настойки гомеопатические матричные ферментированные получают из высушенного лекарственного растительного сырья.

100 частей измельченного высушенного лекарственного растительного сырья, 300 частей воды и 200 частей молочной сыворотки делят на семь порций, и далее изготавливается настойка в соответствии с требованиями, определенными способами 6.1-6.3.

Разведения (потенции) из настоек гомеопатических матричных ферментированных готовят по массе на воде очищенной свежеприготовленной при встряхивании (потенцировании).

Первое десятичное (D1) или первое сотенное разведение (C1) готовят из 1 части настойки гомеопатической матричной ферментированной и 9 или