
**Диоксометилтетрагидропиримидин,
мазь для местного и наружного применения**

ФС.3.1.0025.18

**Диоксометилтетрагидропиримидин,
мазь для местного и наружного применения**

**Dioxomethyltetrahydropyrimidini unguentum
ad usum externum**

Взамен ФС 42-1993-96

Настоящая фармакопейная статья распространяется на лекарственный препарат диоксометилтетрагидропиримидин, мазь для местного и наружного применения. Препарат должен соответствовать требованиям ОФС «Мази» и ниже приведенным требованиям.

Содержит не менее 90,0 % и не более 110,0 % от заявленного количества диоксометилтетрагидропиримидина $C_5H_6N_2O_2$.

Описание. Содержание раздела приводится в соответствии с ОФС «Мази».

Подлинность.

1. Спектрофотометрия. Ультрафиолетовые спектры поглощения испытуемого и стандартного растворов в области длин волн от 220 до 300 нм должны иметь максимумы и минимумы при одних и тех же длинах волн («Количественное определение»).

2. Тонкослойная хроматография. Основная зона адсорбции на хроматограмме испытуемого раствора (10 мкг) по положению, интенсивности поглощения и величине должна соответствовать зоне адсорбции на хроматограмме раствора сравнения А (10 мкг) («Родственные примеси»).