

мл растворителя, выдерживают в ультразвуковой ванне в течение 6 ± 1 мин, охлаждают до комнатной температуры и доводят объём раствора растворителем до метки. 1,0 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят объём раствора растворителем до метки.

Раствор сравнения В. 2,0 мг стандартного образца примеси С кетопрофена помещают в мерную колбу вместимостью 20 мл, прибавляют 15 мл растворителя, выдерживают в ультразвуковой ванне в течение 6 ± 1 мин, охлаждают до комнатной температуры и доводят объём раствора растворителем до метки. 1,0 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят объём раствора растворителем до метки.

Раствор сравнения Г. 10,0 мг стандартного образца этилового эфира кетопрофена помещают в мерную колбу вместимостью 20 мл, прибавляют 15 мл растворителя, выдерживают в ультразвуковой ванне в течение 6 ± 1 мин, охлаждают до комнатной температуры и доводят объём раствора растворителем до метки. 1,0 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят объём раствора растворителем до метки.

Раствор сравнения Д. К 1,0 мл раствора сравнения А прибавляют 1,0 мл раствора сравнения Б и 1,0 мл раствора сравнения В.

Раствор сравнения Е. 1,0 мл стандартного раствора («Количественное определение») помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят объём раствора растворителем до метки. 1,0 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 20 мл и доводят объём раствора растворителем до метки.

Примечание.

Примесь А: 1-(3-бензоилфенил)этан-1-он, CAS 66067-44-5;

примесь С: 3-[(1*RS*)-1-карбоксиэтил]бензойная кислота, CAS 68432-95-1.