
**Кларитромицин, гранулы
для приготовления суспензии
для приема внутрь**

ФС.3.1.0054.18

**Кларитромицин, гранулы
для приготовления суспензии
для приема внутрь**

**Clarithromycini granulae pro
suspensione ad usum peroralem**

Вводится впервые

Настоящая фармакопейная статья распространяется на лекарственный препарат кларитромицин, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь. Препарат должен соответствовать требованиям ОФС «Гранулы», ОФС «Суспензии» и нижеприведенным требованиям.

Содержит не менее 90,0 % и не более 115,0 % от заявленного количества кларитромицина $C_{38}H_{69}NO_{13}$.

Описание. Содержание раздела приводится в соответствии с требованиями ОФС «Гранулы» и ОФС «Суспензии».

Подлинность. ВЭЖХ. Время удерживания пика основного вещества на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика кларитромицина на хроматограмме раствора стандартного образца кларитромицина (раздел «Количественное определение»).

Размер гранул. В соответствии с ОФС «Ситовой анализ».

Седиментационная устойчивость. В соответствии с ОФС «Суспензии» в условиях, указанных в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата.